

## **Kirurgisk fjernelse af hudelementer i lokalbedøvelse**

Fjernelse af fedtknude, taglknude, byld, modernmærke og andre hudlementer i lokalbedøvelse. Inden operationen får du en indsprøjtning af lokalbedøvende medicin på det pågældende sted, således at operationen er smertefri. Bedøvelsen holder i 1-3 timer.

### **Forberedelse**

Undlad at smøre creme på huden.

Tager du blodfortyndende medicin (f.eks. Hjertemagnyl, Marevan, Eliquis, Xarelto eller Clopidogrel), eller har pacemaker skal det oplyses klinikken i god tid før undersøgelsen.

### **Behandling**

Huden desinficeres med klorhexidinsprit, jod eller lignende. Lokalbedøvelsen sprøjtes ind under huden med en tynd nål, det svier og spænder ca. 1 minut. Man kan ved operationen ofte mærke berøring, men ikke smerte. Såret lukkes med en tråd, der skal fjernes efter 7-14 dage på klinikken eller hos praktiserende læge.

### **Efter behandlingen**

Lokalbedøvelsen holder i 2-6 timer. Med mindre andet er aftalt tages almindelig håndkøbsmedicin mod smerter 2 tabl. Pinex à 500 mg. og/ eller 2 tabl. Ipreen à 200 mg.

Forbindingen fjernes efter 3 dage (med mindre andet er aftalt). Ved behov kan såret derefter dækkes med Micropore (købes på apoteket).

Restriktioner: Med mindre andet er aftalt, er der ingen restriktioner, dog frarådes badning i svømmehal og havvand, indtil trådene er fjernet.

### **Komplikationer**

Blødning efter denne type operationer er yderst sjældent forekommende. Hvis det sker, skal du i første omgang, hvile og placere der trykker på området. Dette vil normalt stoppe blødningen. Stopper blødningen ikke, skal du kontakte klinikken eller vagtlægen.

Infektion ses meget sjældent, men kan forekomme og vil kræve behandling med antibiotika. Hvis der optræder infektion, ses det typisk efter 3-4 dage, og symptomerne er rødme og hævelse samt tiltagende smerter. Er du i tvivl, er det bedst, at vi ser det i klinikken. Får du feber skal du straks kontakte klinikken eller vagtlæge.