

Operation omkring endetarmsåbningen

Der kan være tale om operationer for udvendige hæmorider, hudfolder efter hæmorider eller bylder. Inden operationen får du en indsprøjtning af lokalbedøvende medicin på det pågældende sted, således at operationen er smertefri. Bedøvelsen holder i 1-3 timer.

Forberedelse

Tager du blodfortyndende medicin (f.eks. Hjertemagnyl, Marevan, Eliquis, Xarelto eller Clopidogrel), eller har pacemaker skal det oplyses klinikken i god tid før undersøgelsen.

Behandling

Udføres i lokalbedøvelse, som anlægges via stik i eller omkring hæmoriderne.

Efter behandlingen

Der vil de første dage ofte være en del smerter omkring endetarmsåbningen. Det vil derfor være en god ide at tage f.eks. 2 tabl. Pinex á 500mg. samt 2 tabl. Ipren á 200 mg. 3 x dagligt.

Sårene efter operationen efterlades altid åbne og de heler spontant i løbet af 3-6 uger.

Det kan væske fra sårene indtil de er helet.

Det kan bløde fra sårene det første 1-2 døgn og derefter ved afføring, specielt hvis den er hård.

Afføringen

Det er vigtigt, at afføringen holdes i gang og ikke stopper.

Spis fiberrigt anvend evt. HUSK, VI-SIBLIN, LOPPEFRØ eller FIBERSUND.

Disse præparater kan med fordel røres op i A38 eller CULTURA.

Det er vigtigt at understrege, at fremtidig indtagelse af plantefiber i mange tilfælde vil forhindre genopblussen af sygdommen.

Komplikationer

Ses yderst sjældent, der kan optræde blødning og infektion. Ved tegn på større blødning eller tegn på betændelse skal klinikken, vagtlæge eller skadestue straks kontaktes. Yderst sjældent kan der opstå symptomer på en rift og nedsat funktion af lukkemusklen.