

NAVN:

CPR:

TLF:

LÆGE:

Udfyldes af patient:

	JA	NEJ
Smerter		
Hyppig vandladning		
Feber		
Andre symptomer		
Gravid		
Katheter		
Kontrol		
Midtstråle urin		
Været på køl		
Allergi for Penicillin eller Sulfa		

Udfyldes af klinikken:

Glukose:	
Leukocytter:	
Nitrit:	
Protein:	
Blod:	
Mikroskopi:	
Dyrkning her	
Sendes til KMA	

# Vejledning for Midtstråleurin

Urinprøven skal tages for at undersøge, om du har betændelse i urinvejene.

For at prøven skal give så rigtigt resultat som muligt, er det vigtigt at gøre følgende:

- 1: Urinprøven bør tages af morgenurinen. Alternativt minimum 2 timer siden sidste vandladning
- 2: Tis først lidt urin i toiletet. Før derefter prøveglasset eller et opsamlingsglas (f.eks et engangskrus el. lignende) ind i urinstrålen og opsaml lidt urin deri, før den sidste urin tisses i toiletet.
- 3: Hæld urinen i prøveglasset, hvis ikke urinen er opsamlet direkte deri.
- 4: Mærk glasset med navn og cpr.nr.
- 5: Bring prøven til lægen så hurtigt som muligt. Gerne inden kl. 12.00. Hvis der går mere end en time bør prøven opbevares i køleskabet.

- Urinskema, som bedes vedlagt prøven, kan findes her, eller kan udfyldes i lægehuset.

- Urinprøver bør aldrig afleveres i gamle pilleglas, syltetøjsglas, plastikemballage o.l. Der kan afhentes autoriserede prøveglas i lægehuset, eller disse kan købes på apoteket.