








BRISTOLSKALA FOR AFFØRINGSTYPER

Type 1		Separate hårde klumper der ligner nødder.	MOVICOL® DOSIS ØGES
Type 2		Pølseform men med klumper.	MOVICOL® DOSIS ØGES
Type 3		Ligner en pølse men med revner på ydersiden.	MOVICOL® DOSIS FASTHOLDES ✓
Type 4		Ligner en pølse eller orm, smidig og blød.	MOVICOL® DOSIS FASTHOLDES ✓
Type 5		Bløde klumper med skarpe kanter (let at få ud).	MOVICOL® DOSIS REDUCERES
Type 6		Iturevne småstykker.	MOVICOL® DOSIS REDUCERES
Type 7		Vandig uden klumper. Kun væske.	MOVICOL® DOSIS REDUCERES

Reproduceret med tilladelse fra Dr KW Heaton, Reader in Medicine at the University of Bristol.
© 2000 Norgine Pharmaceuticals Limited.

Særligt om type 7: Tal med din læge, hvis din afføring ligner type 7, også når du reducerer MOVICOL®-dosis. Type 7 kan også skyldes de såkaldte fækalomer, hvor indeklemt hård afføring blokerer tarmen. De kan være årsagen til, at en diarrelignende væske ophobes bag ved afføringen og siver ud.

MVC12MSE NOR059 - APRIL 2012



Norgine Danmark A/S
Stamholmen 151, 6.
2650 Hvidovre
Telefon 33 170 400
danmark@norgine.com
www.movicol.dk



Hvis du ofte har hård mave eller forstoppelse.

Navn: _____ Alder: _____ Vægt: _____

Næste besøg

Dato	Tid

MOVICOL®
macrogol 3350, natriumbikarbonat, natriumklorid, kaliumklorid
- virker ved hjælp af vand

Afføringssekema

MOVICOL®

- virker ved hjælp af vand

Uge 1	Antal poser	Antal afføring	Afføringstype*)	Notat
Man				
Tirs				
Ons				
Tors				
Fre				
Lør				
Søn				

Uge 2	Antal poser	Antal afføring	Afføringstype*)	Notat
Man				
Tirs				
Ons				
Tors				
Fre				
Lør				
Søn				

* Se Bristolskala på bagsiden.

Uge 3	Antal poser	Antal afføring	Afføringstype*)	Notat
Man				
Tirs				
Ons				
Tors				
Fre				
Lør				
Søn				

Uge 4	Antal poser	Antal afføring	Afføringstype*)	Notat
Man				
Tirs				
Ons				
Tors				
Fre				
Lør				
Søn				

* Se Bristolskala på bagsiden.

MOVICOL®. Osmotisk virkende afføringsregulerende middel indeholdende macrogol 3350, natriumbikarbonat, natriumklorid og kaliumklorid. Indikation: Behandling af kronisk forstoppelse. Oplosning af hård indeklemt afføring defineret som svær forstoppelse med ophobning af afføring i endetarmen og/eller tyktarmen, konstateret ved lægeundersøgelse af mave-tarm systemet. Dosering og indgivelsesmåde: Kronisk forstoppelse: Voksne: 1-3 breve dagligt afhængigt af individuelt respons. En behandling varer normalt ikke længere end 2 uger, men kan gentages om nødvendigt. Svær forstoppelse: Voksne: 8 breve indtaget over 6 timer, opløst i 1 liter vand. Behandling varer normalt ikke længere end 3 dage. Patienter med nedsat hjertepumpefunktion: Ved behandling af svær forstoppelse bør dosis fordeles således, at der ikke gives mere end 2 breve inden for en time. Administration: Før anvendelse skal hver pose indhold opløses i 125 ml vand. Børn: Bør ikke anvendes til børn under 12 år, da erfaringen med behandling af børn er utilstrækkelig. Patienter med nedsat nyrefunktion: Dosisjustering er ikke nødvendig. Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen: Årsagen til forstoppelsen bør undersøges, hvis der dagligt er behov for afføringsmidler. Interaktioner: Det er muligt at optagelsen af andre lægemidler kan være reduceret ved anvendelsen af MOVICOL®. Der har været enkeltstående tilfælde med nedsat effekt af nogle lægemidler, f.eks. epilepsimidler der blev givet samtidigt. Graviditet og amning: Graviditet: Der er ingen erfaring med anvendelse af macrogol 3350 under graviditet. Dyreforsøg har ikke vist fosterskadelige virkninger. Da macrogol 3350 kun optages i ringe grad, kan administration til gravide kvinder overvejes efter vurdering af risici og fordele. Anning: Erfaring savnes. Da macrogol 3350 kun optages i ringe grad, må risikoen for bivirkninger hos det ammede barn anses for at være ringe. Bivirkninger: Meget almindelige: Mavesmerter, mavekrampe, diarré, opkastning, kvalme, maverumlen, luft i maven. Almindelige: Kløe, hovedpine hævede arme og ben. Ikke almindelige: Udslet, ubehag overst i maven, udspiling af maven. Meget sjælden: Allergiske reaktioner, anal irritation. Overdosering: svære mavesmerter, udtalt væsketab som følge af diarré. Udlevering: HF: Tilskud: Ikke tilskudsberettiget, men der kan søges om individuelt tilskud. Pakninger: MOVICOL® 8 stk. v.nr. 530162. 20 stk. v.nr. 014852. 50 stk. v.nr. 530188 og 100 stk. v.nr. 015461, MOVICOL® Chokolade 20 stk. v.nr. 194534, 50 stk. v.nr. 375556 ikke fast pris. Pulver til oral opløsning. Forkortet udgave af det af Lægemiddelstyrelsen godkendte produktresumé, som kan rekvireres hos Norgine Danmark A/S på tlf. 33 170 400. Læs altid indlægsseddelen grundigt igennem før brug af medicinen. Husk altid at kontakte lægen eller apoteket i tvivlstilfælde. Januar 2012. MVCI2MSENR002

Evt. bemærkninger:
